

11

Naučná stezka Podskalí Fauna a flóra Kalvárie



Skalnaté břehy kolem řeky Otavy, stejně jako většinu území celého Strakonicka, pokrývaly před příchodem člověka – zemědělce listnaté lesy s převahou dubu letního (*Quercus robur*) a lípy srdčité (*Tilia cordata*). V dnešní době se zde již vyskytují javory (*Acer*), olše (*Alnus*), ale také jihoamerický trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*).

Lesnatá strán před námi je zbytkem téměř původní doubravy s bohatou hájovou květenou. Můžeme zde vidět zejména ptačinec velkokvětý (*Stellaria holostea*), kokořík vonný (*Polygonatum odoratum*) a mnohokvětý (*P. multiflorum*), třtinu rákosovitou (*Calamagrostis arundinacea*), náprstník velkokvětý (*Digitalis grandiflora*), pryšec sladký (*Euphorbia dulcis*), pitulník žlutý (*Galeobdolon luteum*), svízel lesní (*Galium sylvaticum*), řimbabu chocholičnatou (*Pyrethrum corymbosum*), plicník tmavý (*Pulmonaria obscura*), ještěrábek savojský (*Hieracium sabaudum*) a Lachenalův (*H. lachenalii*), vzácně lilii zlatohlavou (*Lilium martagon*), kostival hlíznatý (*Symphytum tuberosum*), sasanku pryskyřníkovitou (*Anemone ranunculoides*) aj. Nápadná je udatna lesní (*Aruncus vulgaris*), vyskytující se ve stinných, zaříznutých údolích.

Z druhů typických spíše pro šumavská podhůří zde najdeme věsenku nachovou (*Prenanthes purpurea*), zvonečník černý (*Phyteuma nigrum*), chrastavec lesní (*Knautia dipsacifolia*) či starček německý (*Senecio germanicus*). Vidíme tu i některé druhy nepůvodní, např. kakost hnědočervený (*Geranium phaeum*), invazní druhy, netýkavku žláznatou (*Impatiens glandulifera*) a netýkavku malokvětou (*Impatiens parviflora*), které se místy šíří na úkor původní květeny.

Území se vyznačuje i velkou druhovou bohatostí mechů (*Bryopsida*) a jim příbuzných játrovek (*Marchantiophyta*). Na stromech vyrůstají dřevokazné houby z čeledi chorošovitých (*Polyporaceae*) a kožovkovitých (*Hymenochaetaceae*), najít můžete také ucho Jidášovo (*Auricularia auricula-judae*).

Kromě hojného drobného ptactva může pozorný návštěvník vidět z obojživelníků skokana hnědého (*Rana temporaria*), z plazů ještěrku obecnou (*Lacerta agilis*), slepýše křehkého (*Anguis fragilis*) nebo neježdovatou užovku obojkovou (*Natrix natrix*). Ze savců je oblíbeným společníkem veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) a na zemi se schovává myšice lesní (*Apodemus flavicollis*). Na lilích spatříme nápadného červeného brouka chřestovníčka liliového (*Lilioceris lili*).



Fauna and flora on Kalvárie Hill

The rocky left and right banks of the Otava River, like most of the territory of the Strakonice area, were covered before the arrival of farmers with deciduous forests dominated by oak and linden trees. The deciduous Zellerin hillside in front of us is all that remains of the original woods and its plentiful woodland flora.

As for animal species, in addition to plenty of small birds you can also find the common frog, the common salamander, the non-poisonous grass snake, and the common squirrel.



Projekt byl podpořen v roce 2019 z rozpočtu Jihočeského kraje.
www.jihocesky.cz #jiznicechy



Zpracovalo město Strakonice. www.strakonice.eu
Foto: archiv města Strakonice, R. Paulič,
Zachránná stanice živočichů Makov - L. Šejna,
ČSOP - V. Hrdlička, archiv Muzea středního
Pootaví Strakonice